

Stævnedede bøge – svampe og fugle



Stævnedede bøge

Stævnedede bøge

Gamle bøgetræer er i tidens løb blevet skåret ned flere gange, så der kunne hentes træ til brænde og byggeri.

Stubbene har sat nye skud og resultatet er blevet nogle ret forgrenede træer, der leder tankerne hen på en troldeskov.

Vækstbetingelserne for træerne bestemmer, hvor krogede træerne bliver.

Svampe

I skoven gror mange forskellige svampe, som Skørhatte, Amatysthatte og Slørhatte.

Skørhatte

Disse svampe hører til skovens mest farvestrålende. De har alle lyse og sprøde lameller, der er lette at knække. Desuden har de solide sprøde og fedtagtige stokke uden pynt, mens hattene er mangefarvet.

Amatysthatte

Violet amatysthat er en almindelig svamp i bøgeskoven. Svampene varierer meget i form og farve. De har en sej stok og tynde, tætte lameller.

Slørhatte

Som regel større svampe med lameller. Lamellerne er dækket af en form for slør, der ligner et spindelvæv. Sløret svinder med tiden ind på ældre slørhatte.

Svampene kan skifte form og farve med alderen og efter hvor fugtigt, det er. De fleste slørhatte er giftige.

Fugle

Blandt skovens mange fugle kan nævnes: Dompap, grønsisken, skovskade og stor flagspætte der er den almindeligste spætte i Danmark. Spætten kan ses og høres året rundt.



Gjern Natur

www.gjern-natur.dk
post@gjern-natur.dk

